

Guía de cuidados

Plantas carnívoras · Trampa Verde



Al recibir tu planta

- 1 Ábrela apenas llegue**
Retira caja, papel y bolsa con cuidado.
- 2 Revisa el sustrato**
Si está seco, ponla en un plato con 1–2 cm de agua pura.
- 3 Luz gradual**
3–5 días con luz brillante sin sol fuerte; luego a su lugar definitivo.
- 4 No trasplantes aún**
Espera 3–4 semanas; idealmente hazlo en primavera.
- 5 Hojas negras: normal**
Córtalas con tijera limpia; saldrán hojas nuevas.
- 6 No la alimentes**
Ni actives las trampas. Cazará sola.

Reglas generales

Riego

- Solo agua de lluvia, destilada u osmosis.
- Bandeja con 1–2 cm de agua (Dionaea, Drosera, Sarracenia, Utricularia).
- Nepenthes y Pinguicula: húmedo, sin agua estancada.

Luz

- 4–6 h de sol directo para las de pantano.
- Verde pálido y estirada = falta luz.
- Interior: ventana norte o LED de cultivo.

Sustrato

- Turba rubia + perlita 50/50.
- Nunca abono ni tierra de hoja.
- Maceta plástica con agujeros.

Invierno

- Dionaea y Sarracenia: dormancia fría 3–4 meses (0–10 °C).
- Pierden hojas: es normal.
- Nepenthes, Pinguicula y Utricularia no duermen.

Nunca hagas esto

- Regar con agua de la llave o mineral
- Abonar o usar tierra de hoja
- Darles carne o comida humana
- Activar trampas con el dedo
- Tenerlas en un rincón oscuro
- Encerrarlas en un frasco

Cuidados por tipo

Tipo	Luz	Riego	Temperatura	Tip
Dionaea <i>Venus atrapamoscas</i>	Sol directo, ideal exterior	Bandeja permanente; menos en invierno	Calor y heladas suaves	Corta la vara floral para trampas más grandes
Drosera <i>Rocío de sol</i>	Mucha luz	Bandeja siempre	Según especie	Sin rocío = más luz y humedad
Sarracenia <i>Planta jarro</i>	Pleno sol	Bandeja generosa	Muy resistente al frío	En invierno corta jarros secos
Nepenthes <i>Jarra tropical</i>	Brillante indirecta	Húmedo sin encharcar	Sobre 12 °C, interior	Humedad 60%+ para formar jarras
Pinguicula <i>Grasilla</i>	Ventana luminosa	Moderado; casi seco en invierno	10–30 °C	Roseta invernal: riega poco
Utricularia <i>Bladderwort</i>	Brillante, sin sol fuerte	Sustrato siempre mojado	10–30 °C	Sus trampas están bajo tierra

Calendario anual (Chile)

Primavera • sep–nov Despiertan. Trasplante y división. Aumenta el riego y sácalas al sol.	Verano • dic–feb Máximo crecimiento. Bandeja siempre con agua; cuidado con olas de calor sobre 38 °C.
Otoño • mar–may Crecimiento más lento. Ve reduciendo el riego en las templadas.	Invierno • jun–ago Dormancia de Dionaea y Sarracenia: frío, poca agua, sin preocuparse por hojas secas.

Problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Solución
Trampas negras	Estrés, comida grande o trampas activadas muchas veces	Cortar y no tocar; es normal en pocas hojas
Planta verde pálida	Falta de luz	Más horas de sol o luz LED
Puntas cafés y secas	Agua con sales o sustrato seco	Cambiar a agua pura y mantener bandeja
Hongo / moho gris	Poca ventilación en invierno	Retirar hojas muertas y ventilar
Nepenthes sin jarras	Humedad o luz baja	Subir humedad, acercar a ventana